

ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION EN LOS CANCERES SECUNDARIOS DE HUESO

Por los

DOCTORES DE SEZE, FLAMAND Y DESMICHELLE

(*Bull. et Mém. Soc. Méd. Hop., de París*, 1953, 69, 162-169)

Los autores han estudiado la velocidad de sedimentación en 40 casos de metástasis cancerosa en hueso, comprobando que existe un marcado aumento de la V. S., alcanzando cifras entre 40 y 90 mm. a la primera hora. Parece que existe cierto paralelismo entre el origen de la metástasis y los valores de la V. S., correspondiendo las cifras más elevadas a las metástasis de los cánceres prostáticos, las menos a las del tubo digestivo, ocupando el término medio las metástasis de la mama, pulmón y útero.

Ese aumento de la velocidad de sedimentación no viene condicionado ni por la infección ni por la anemia, que puedan acompañar al cáncer, y por otra parte es la metástasis ósea la que produce dicho aumento, pues en unos casos se obtuvieron V. S. normales antes de aparecer las metástasis y en otros cuando ésta se presentó hacia tiempo que el tumor primitivo había sido extirpado.

En un estudio comparativo de siete casos de metástasis vertebral cancerosa y siete de mal de Pott, encuentran que la V. S. está francamente acelerada en los primeros. También han estudiado la V. S. en 20 casos de osteoporosis en los que se planteaba el diagnóstico diferencial con una metástasis, y excepto en dos—con velocidad de 38 mm. y 42 mm. en la primera hora—los demás tenían una V. S. inferior a 20 mm. a la hora.