

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LA PULPA POR «COIFFAGES»

por

TRAJKO CVETKOVICH (Ljubljana)

Nuestro fin ha sido poner al día, para el *coiffage* de la pulpa (indirecto o directo, con o sin amputación vital), una pasta bactericida que estimule la formación de dentinas secundarias. La técnica del *coiffage* no se aleja de los procedimientos clásicos y hemos seguido el siguiente plan:

1.—Los pacientes fueron seleccionados a fin de extender la experimentación a todas las formas clínicas de pulpitis.

2.—Para demostrar la acción dentogénica de la pasta medicamentosa han sido ejecutadas radiografías dentarias antes y después del tratamiento; se han practicado controles clínicos sistemáticos después de algunos meses para apreciar *de visu* si la brecha dentinaria estaba con dentina secundaria. Por último, fueron practicados controles histológicos sobre algunos dientes temporales previamente sometidos a *coiffages* directos de la pulpa cameral.

3.—Para determinar la composición de la pasta hemos debido: emplear medicamentos de acción sinérgica y no antagonista; verificar su acción en cajas de Petri sobre cultivos bacterianos de la flora bucal; conciliar los pH elevados necesarios para la dentinogénesis y los pH más bajos de ciertos agentes terapéuticos; dar a la pasta la consistencia conveniente para facilitar su manipulación.

Esta pasta contiene las siguientes sustancias químicas: los antibióticos más modernos y de amplio espectro de acción; los medios de dentinogénesis ya conocidos y empleados.

RESULTADOS

Los primeros ensayos sobre 50 casos demostraron que la acción bactericida y curativa del *antipulpit* era satisfactoria, pero la formación de dentina secundaria sólo se obtuvo en el 50 por 100, aunque la pulpa se mantuvo viva bajo el *coiffage* en todos los casos controlados.

Los siguientes ensayos demostraron que era posible obtener, a la vez, el tratamiento curativo de la pulpitis y formación de dentina secundaria en la proporción del 95 por 100 de casos (en 100 casos tratados).

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Las indicaciones de *coiffage* son las siguientes:

Hiperemia de la pulpa secundaria a una caries profunda (*coiffage* indirecto); pulpitis aguda serosa parcial (*coiffage* indirecto o directo); pulpitis aguda serosa total (*coiffage* directo o amputación total de la pulpa); pulpitis crónica proliferativa (*coiffage* directo o amputación vital de la pulpa), con reservas sobre el pronóstico; pulpitis aguda purulenta parcial (amputación vital de la pulpa); con reservas sobre el pronóstico.

Las contraindicaciones son las siguientes: pulpitis aguda purulenta total; pulpitis crónica ulcerosa; gangrena pulpar.

(*Revue de Stomatologie*, t. 60, n.º 6, junio 1959.)